

Mikor kell alkalmazni a PLENVU®-t?

A PLENVU® - amely egy béltisztításra szolgáló hashajtó készítmény - 1. és 2. adagjának bevétele a **vastagbéltükrözés előtti nap estéjén a kezelőorvosa által meghatározottak szerint** történjen. Ha kezelőorvosa másként nem rendeli **az 1. adagot körülbelül 18 órakor vegye be. A két adag bevétele között minimum 1 órának kell eltelnie.**

Vastagbéltükrözés időpontja

Dátum:

Időpont:

1. adag PLENVU® bevétele


Dátum:

Időpont:

2. adag PLENVU® bevétele

Dátum:


Időpont:



A PLENVU® doboza 3 tasakot tartalmaz:

1 1. Adag (1 tasak)
mangó ízesítésű

2 2. Adag (2 tasak: A és B jelöléssel)
gyümölcsponcs ízű



Hogyan készítse el és alkalmazza a béltisztító folyadékot (PLENVU®-t)?

1. LÉPÉS: Nyissa ki a dobozt és vegye ki az 1. adag tasakját. Az 1. adag tasakjának tartalmát töltse egy tartályba, amelybe befér 500 ml folyadék. Az 1. adag tasakjának tartalmát töltse fel 500 ml térfogatra vízzel, és keverje, amíg a por teljesen feloldódik. Ez körülbelül 8 percet vehet igénybe.



2. LÉPÉS: A kapott oldatot 30 perc alatt kell meginni, valamint a következő 30 percben további 500 ml tiszta folyadék* elfogyasztása javasolt.



3. LÉPÉS: A béltisztító 2. adagját az első adag bevitelét követően legkorábban egy órával később készítse el. A 2. adag A. és B. tasakjának tartalmát töltse egy tartályba. Töltse fel 500 ml térfogatra vízzel, és keverje, amíg a por teljesen feloldódik. Ez is körülbelül 8 percet vehet igénybe.



4. LÉPÉS: Az így elkészített oldatot 30 perc alatt kell meginni, valamint a következő 30 percben további 500 ml tiszta folyadék* elfogyasztása javasolt.



A tiszta folyadékok fogyasztása hozzájárul a folyadékvesztés (kiszáradás) megelőzéséhez. További tiszta folyadékot ihat a PLENVU® bevétele előtt, közben és után, de **a klinikai beavatkozás előtt 1–2 órával már nem ihat.**

*Tiszta folyadék: Víz, leves alaplé, hígított szörpök/tiszta gyümölcslevek (gyümölcsrost nélkül), gyógynövénytea, fekete tea vagy kávé (tej nélkül) mind fogyasztható.

Melyek az étkezésre és folyadékfogyasztásra vonatkozó legfontosabb tanácsok?



A vastagbélűkrözés előtti napon Ön
elfogyaszthat egy **könnyű reggelit**



és egy **könnyű ebédet, amelyet legalább**
3 órával az első adag PLENVU® bevétele előtt
be kell fejeznie.



A PLENVU® alkalmazása alatt, illetve
azt követően tilos ennie, csak a klinikai
beavatkozás befejezése után lehet. A klinikai
beavatkozás reggelén nem lehet reggelit.



PLENVU® elkészítése,
alkalmazása

1 óra
szünet



Fontos, hogy az előírt mennyiségű tiszta
folyadékot megigya. A kezelés részeként
elfogyasztott folyadékok mellett bármilyen
mennyiségű tiszta folyadék fogyasztható.
Tiszta folyadéknak minősülnek pl.: víz, leves
alaplevek, gyógynövénytea, fekete tea vagy
kávé (tej nélkül), üdítőitalok, hígított szörpök és
tisztá gyümölcslevek rost nélkül.



Fontos, hogy mindennemű folyadékbevitelt le
kell állítani legalább:

- két órával a klinikai beavatkozás előtt, ha
altatásban végzik a beavatkozást, vagy
- egy órával a klinikai beavatkozás előtt, ha
altatás nélkül végzik a beavatkozást.
- **Ne igyon alkoholt, tejet**
- **Ne igyon vörös vagy lila színű folyadékot**
(például feketeribizli-lé)
- **Ne igyon semmilyen pépesített gyümölcsöt**
tartalmazó folyadékot



Mi várható a készítmény bevétele után?

Amikor elkezdi inni a PLENVU® oldatot,
fontos, hogy a toalett közelében legyen, mert
egy adott pillanatban vizes székletürítési
ingereket fog tapasztalni. Ez teljesen normális,
és azt jelzi, hogy a PLENVU® oldat hat.
Amennyiben követi ezeket az utasításokat,
a belei tiszták lesznek, és ez hozzájárul a
vizsgálat sikerességéhez. Ellenkező esetben
szükséges lehet a vizsgálat megismétlése.



PLENVU®

Por belsőleges oldathoz

Makrogol 3350, Nátrium-aszkorbát, Vízmentes nátrium-szulfát,
Aszkorbinsav, Nátrium-klorid és Kálium-klorid

A PLENVU® a bél tisztítására javallott oldat 18 éves vagy
annál idősebb felnőtteknél, minden olyan beavatkozás előtt,
amelyhez tiszta bél szükséges.

Kérjük a sikeres kezelés érdekében az előírások szerint
alkalmazza a PLENVU® port belsőleges oldathoz és tartsa
be az orvos utasításait! A jelen tájékoztató a PLENVU® por
belsőleges oldathoz hatályos beteg tájékoztatója alapján
készült. **Kérjük a teljes körű tájékoztatás érdekében olvassa**
el a termék csomagolásában elhelyezett beteg tájékoztatót!
A jelen tájékoztató nem helyettesíti a szakorvosi konzultációt
és az orvosi vizsgálatot.

Amennyiben 6 órával a PLENVU® bevétele után nincs széklete,
hagyja abba a bevételt, és azonnal lépjen kapcsolatba
kezelőorvosával. Ha Önnek az alábbiak közül bármelyik
mellékhatás jelentkezik, hagyja abba a PLENVU® alkalmazását,
és azonnal tájékoztassa kezelőorvosát, mivel ezek súlyos
allergiás reakció tünetei lehetnek: extrém kimerültség,
heves szívdobogásérzet (palpitáció), kiütés vagy viszketés,
nehézlégzés, az arc, boka vagy más testrész duzzanata.

Ha Önnek az alábbiak közül bármelyik tünet jelentkezik a PLENVU®
alkalmazása során, azonnal tájékoztassa kezelőorvosát, mivel
ezek a túlzott folyadékvesztést (kiszáradás) jelezhetik: szédülés,
fejfájás, a normálisnál ritkább vizelés, hányás. Továbbá, azonnal
tájékoztassa kezelőorvosát, ha súlyos gyomortáji (hasi) fájdalom
van. Gyakori mellékhatások (10-ből legfeljebb 1 személyt érinthet):
kiszáradás, émelygés (hányinger), hányás.

Amennyiben a PLENVU® por belsőleges oldathoz alkalmazása
szórán bármilyen mellékhatást tapasztal haladéktalanul forduljon
kezelőorvosához!

Ezen információs anyag csak azon betegeknek adható át, akik
kezelőorvosa vagy gyógyszerésze PLENVU® por belsőleges
oldathoz gyógyszert javasolt!

A forgalomba hozatali engedély jogosultjának helyi képviselője:

Swixx Biopharma Kft.

1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.

Tel.: +36 1 9206 570

e-mail: medinfo.hungary@swixxbiopharma.com

A terméket a Swixx BioPharma licenc alapján forgalmazza.

A PLENVU, a NORGINE és a vitorla logók a Norgine vállalatcsoport
bejegyzett védjegyei.

Kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el
a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát,
gyógyszerészét!

Azonosító kód: PM-HU-2022-3-703

A dokumentum lezárásának dátuma: 2022.03.16.



Mikor kell alkalmazni a PLENVU®-t?

A PLENVU® - amely egy béltisztításra szolgáló hashajtó készítmény - **1. adagjának bevétele a vastagbél-tükrözés előtti nap estéjén és a 2. adag bevétele a klinikai beavatkozás napján kora reggel a kezelőorvosa által meghatározottak szerint** történjen. Ha kezelőorvosa másként nem rendeli **az 1. adag bevétele a vastagbél-tükrözést megelőző este (körülbelül 18 órakor) a 2. adag bevétele a beavatkozás napján kora reggel (körülbelül reggel 6 órakor) történjen.**

Vastagbél-tükrözés időpontja

Dátum:

Időpont:

1. adag PLENVU® bevétele


Dátum:

Időpont:

2. adag PLENVU® bevétele

Dátum:


Időpont:



A PLENVU® doboza 3 tasakot tartalmaz:

1 1. Adag (1 tasak)
mangó ízesítésű

2 2. Adag (2 tasak: A és B jelöléssel)
gyümölcsponcs ízű




Hogyan készítse el és alkalmazza a béltisztító folyadékot (PLENVU®-t)?

1. LÉPÉS: Nyissa ki a dobozt és vegye ki az 1. adag tasakját. Az 1. adag tasakjának tartalmát töltsé egy tartályba, amelybe befér 500 ml folyadék. Az 1. adag tasakjának tartalmát töltsé fel 500 ml térfogatra vízzel, és keverje, amíg a por teljesen feloldódik. Ez körülbelül 8 percet vehet igénybe.




2. LÉPÉS: A kapott oldatot 30 perc alatt kell meginni, valamint a következő 30 percen további 500 ml tiszta folyadék* elfogyasztása javasolt.



3. LÉPÉS: A béltisztító 2. adagját az első adag bevitelét követően legkorábban egy órával később készítse el. A 2. adag A. és B. tasakjának tartalmát töltsé egy tartályba. Töltsé fel 500 ml térfogatra vízzel, és keverje, amíg a por teljesen feloldódik. Ez is körülbelül 8 percet vehet igénybe.



4. LÉPÉS: Az így elkészített oldatot 30 perc alatt kell meginni, valamint a következő 30 percen további 500 ml tiszta folyadék* elfogyasztása javasolt.



A tiszta folyadékok fogyasztása hozzájárul a folyadékvesztés (kiszáradás) megelőzéséhez. További tiszta folyadékot ihat a PLENVU® bevétele előtt, közben és után, de **a klinikai beavatkozás előtt 1-2 órával már nem ihat.**

*Tiszta folyadék: Víz, leves alaplé, hígított szörpök/tiszta gyümölcslevek (gyümölcsrost nélkül), gyógynövénytea, fekete tea vagy kávé (tej nélkül) mind fogyasztható.

Melyek az étkezésre és folyadékfogyasztásra vonatkozó legfontosabb tanácsok?



A vastagbéltükrözés előtti napon Ön
elfogyaszthat egy **könnyű reggelit**



és egy **könnyű ebédet, amelyet legalább
3 órával az első adag PLENVU® bevétele előtt
be kell fejeznie.**



**A PLENVU® alkalmazása alatt, illetve
azt követően tilos ennie, csak a klinikai
beavatkozás befejezése után ehet.** A klinikai
beavatkozás reggelén nem ehet reggelit.



PLENVU® elkészítése, alkalmazása



Fontos, hogy az előírt mennyiségű tiszta
folyadékot megigya. A kezelés részeként
elfogyasztott folyadékok mellett bármilyen
mennyiségű tiszta folyadék fogyasztható.
Tiszta folyadéknak minősülnek pl.: víz, leves
alaplevek, gyógynövénytea, fekete tea vagy
kávé (tej nélkül), üdítőitalok, hígított szörpök és
tisztá gyümölcslevek rost nélkül.



Fontos, hogy mindennemű folyadékbevitelt le
kell állítani legalább:

- két órával a klinikai beavatkozás előtt, ha
altatásban végzik a beavatkozást, vagy
- egy órával a klinikai beavatkozás előtt, ha
altatás nélkül végzik a beavatkozást.
- **Ne igyon alkoholt, tejet**
- **Ne igyon vörös vagy lila színű folyadékot
(például feketeribizli-lé)**
- **Ne igyon semmilyen pépesített gyümölcsöt
tartalmazó folyadékot**



Mi várható a készítmény bevétele után?

Amikor elkezdí inni a PLENVU® oldatot,
fontos, hogy a toalett közelében legyen, mert
egy adott pillanatban vizes székletürítési
ingereket fog tapasztalni. Ez teljesen normális,
és azt jelzi, hogy a PLENVU® oldat hat.
**Amennyiben követi ezeket az utasításokat,
a belei tiszták lesznek, és ez hozzájárul a
vizsgálat sikerességéhez. Ellenkező esetben
szükséges lehet a vizsgálat megismétlése.**

**A PLENVU® a bél tisztítására javallott oldat 18 éves vagy
annál idősebb felnőtteknél, minden olyan beavatkozás előtt,
amelyhez tiszta bél szükséges.**

Kérjük a sikeres kezelés érdekében az előírások szerint
alkalmazza a PLENVU® port belsőleges oldathoz és tartsa
be az orvos utasításait! A jelen tájékoztató a PLENVU® por
belsőleges oldathoz hatályos beteg tájékoztatója alapján
készült. **Kérjük a teljes körű tájékoztatás érdekében olvassa
el a termék csomagolásában elhelyezett beteg tájékoztatót!**
**A jelen tájékoztató nem helyettesíti a szakorvosi konzultációt
és az orvosi vizsgálatot.**

Amennyiben 6 órával a PLENVU® bevétele után nincs széklete,
hagyja abba a bevételt, és azonnal lépjen kapcsolatba
kezelőorvosával. Ha Önnél az alábbiak közül bármelyik
mellékhatás jelentkezik, hagyja abba a PLENVU® alkalmazását,
és azonnal tájékoztassa kezelőorvosát, mivel ezek súlyos
allergiás reakció tünetei lehetnek: extrém kimerültség,
heves szívdobogásérzet (palpitáció), kiütés vagy viszketés,
nehézlégzés, az arc, boka vagy más testrész duzzanata.

Ha Önnél az alábbiak közül bármelyik tünet jelentkezik a PLENVU®
alkalmazása során, azonnal tájékoztassa kezelőorvosát, mivel
ezek a túlzott folyadékvesztést (kiszáradás) jelezhetik: szédülés,
fejfájás, a normálisnál ritkább vizelés, hányás. Továbbá, azonnal
tájékoztassa kezelőorvosát, ha súlyos gyomortáji (hasi) fájdalom
van. Gyakori mellékhatások (10-ből legfeljebb 1 személyt érinthet):
kiszáradás, émelygés (hányinger), hányás.

**Amennyiben a PLENVU® por belsőleges oldathoz alkalmazása
során bármilyen mellékhatást tapasztal haladéktalanul forduljon
kezelőorvosához!**

**Ezen információs anyag csak azon betegeknek adható át, akik
kezelőorvosa vagy gyógyszerésze PLENVU® por belsőleges
oldathoz gyógyszert javasolt!**

A forgalomba hozatali engedély jogosultjának helyi képviselője:

Swixx Biopharma Kft.

1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.

Tel.: +36 1 9206 570

e-mail: medinfo.hungary@swixxbiopharma.com

A terméket a Swixx BioPharma licenc alapján forgalmazza.

A PLENVU, a NORGINE és a vitorla logók a Norgine vállalatcsoport
bejegyzett védjegyei.

**Kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el
a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát,
gyógyszerészét!**

Azonosító kód: PM-HU-2022-3-1038

A dokumentum lezárásának dátuma: 2022.04.04.



PLENVU®

Por belsőleges oldathoz

Makrogol 3350, Nátrium-aszkorbát, Vízmentes nátrium-szulfát,
Aszkorbinsav, Nátrium-klorid és Kálium-klorid



Swixx  **BioPharma**
Modern Medicines for All